

附件 2（略）

附件 3

鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒二联活疫苗等

9 种兽药产品说明书和标签

一、鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒二联活疫苗说明书和标签

（一）鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒二联活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒二联活疫苗

商品名 威多妙喉痘

英文名 Fowl Pox-Laryngotracheitis Vaccine, Live Fowl Pox Vector

汉语拼音 Ji Chuanranxinghouqiguanyan Chongzujidoubingdu Erlian Huoyimiao

【主要成分与含量】 每羽份含表达鸡传染性喉气管炎病毒 gB 蛋白和 UL32 蛋白的重组鸡痘病毒至少 $10^{2.7}$ TCID₅₀。

【性状】 淡黄色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎和鸡痘。

【用法与用量】 翅翼膜刺种。用于 8 周龄及 8 周龄以上鸡。将疫苗稀释后用刺种器蘸取疫苗液，将刺种器刺到翅翼膜，每只 1 羽份。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 （1）仅用于接种健康鸡。

（2）在一个鸡场同时接种相同日龄鸡。

（3）鸡只接种本疫苗前不应接种鸡痘疫苗。

（4）不要接种开产前 4 周以内或产蛋期的鸡。

（5）疫苗现用现配，稀释后的疫苗应一次全部用完。

（6）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

（7）疫苗中含有庆大霉素和两性霉素 B。

（8）屠宰前 21 日内禁用。

【规格】 （1）500 羽份/瓶 （2）1000 羽份/瓶 （3）2000 羽份/瓶 （4）4000 羽份/瓶

【包装】 10 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 21 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 诗华美国百妙动物保健公司（Biomune Company）

地址 8906 Rosehill Road, Lenexa, KS 66215 U.S.A.

电话 +1 (913) 894 0230

仅在兽医指导下使用

(二) 鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒二联活疫苗内包装标签

兽用

威多妙喉痘

鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒二联活疫苗

500 (1000、2000、4000) 羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批 号:

详见说明书。

有效期至:

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎和鸡痘。

【用法与用量】 翅翼膜刺种。用于8周龄及8周龄以上鸡。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存, 有效期为21个月。

【生产企业】 诗华美国百妙动物保健公司 (Biomune Company)

仅在兽医指导下使用

二、酒石酸泰乐菌素可溶性粉说明书和标签

(一) 酒石酸泰乐菌素可溶性粉说明书

兽用

【兽药名称】

通用名: 酒石酸泰乐菌素可溶性粉

商品名: 泰农[®]可溶性粉 (Tylan[®] Soluble)

英文名: Tylosin Tartrate Soluble Powder

汉语拼音: Jiushisuan Tailejunsu Kerongxingfen

【主要成分】 酒石酸泰乐菌素

【性状】 本品为白色至淡黄色粉末。

【药理作用】 大环内酯类抗生素。泰乐菌素对支原体、革兰氏阳性菌和部分革兰氏阴性菌有杀灭作用, 敏感菌有金黄色葡萄球菌、化脓链球菌、肺炎链球菌、化脓棒状杆菌等。

本品内服后易从胃肠道 (主要是肠道) 吸收。泰乐菌素吸收后在体内广泛分布。由于药物在体内经肝肠循环再吸收, 故鸡在内服 6 小时后, 其血浓度和脏器浓度常高于 1 小时的浓度。泰乐菌素主要以原型排出。

【适应证】 主要用于治疗鸡革兰氏阳性菌及支原体感染; 辅助治疗由产气荚膜梭菌引起的鸡坏死性肠炎。

【用法与用量】 以泰乐菌素计。混饮: 治疗鸡革兰氏阳性菌及支原体感染, 每 1L 水 500mg, 连用 5~7 日; 辅助治疗由产气荚膜梭菌引起的鸡坏死性肠炎, 每 1L 水 50~150mg, 连用 7 日。

【注意事项】 (1) 本品禁与酸性物质配伍。

(2) 泰乐菌素对林可霉素类有拮抗作用, 不宜同用。

(3) 蛋鸡产蛋期禁用。

(4) 含药饮水 24 小时内未用完应丢弃。

(5) 本品可能引起过敏，应避免直接接触。

【不良反应】 按推荐剂量使用，未见不良反应。

【休药期】 鸡 5 日。

【规格】 (1) 50g (5000 万单位) (2) 100g (10000 万单位)

(3) 500g (50000 万单位) (4) 1kg (100000 万单位) (5) 50kg (5000000 万单位)

【包装】

【贮藏】 密闭、在干燥处保存。

【有效期】 3 年

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 美国礼来公司英国生产厂 (Eli Lilly and Company Limited)

地址: Fleming Road, Speke, Liverpool, Merseyside, L24 9LN, United Kingdom

(二) 酒石酸泰乐菌素可溶性粉标签

兽用

【兽药名称】

通用名: 酒石酸泰乐菌素可溶性粉

商品名: 泰农[®]可溶性粉 (Tylan[®] Soluble)

英文名: Tylosin Tartrate Soluble Powder

汉语拼音: Jiushisuan Tailejunsu Kerongxingfen

【主要成分】 酒石酸泰乐菌素

【适应证】 主要用于治疗鸡革兰氏阳性菌及支原体感染; 辅助治疗由产气荚膜梭菌引起的鸡坏死性肠炎。

【用法与用量】 以泰乐菌素计。混饮: 治疗鸡革兰氏阳性菌及支原体感染, 每 1L 水, 500mg, 连用 5~7 日; 辅助治疗由产气荚膜梭菌引起的鸡坏死性肠炎, 每 1L 水, 50~150mg, 连用 7 日。

【注意事项】 (1) 本品禁与酸性物质配伍。

(2) 泰乐菌素对林可霉素类有拮抗作用, 不宜同用。

(3) 蛋鸡产蛋期禁用。

(4) 含药饮水 24 小时内未用完应丢弃。

(5) 本品可能引起过敏, 应避免直接接触。

【休药期】 鸡 5 日

【规格】 (1) 50g (5000 万单位) (2) 100g (10000 万单位)

(3) 500g (50000 万单位) (4) 1kg (100000 万单位) (5) 50kg (5000000 万单位)

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】 密闭、在干燥处保存。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 美国礼来公司英国生产厂（Eli Lilly and Company Limited）

地址：Fleming Road, Speke, Liverpool, Merseyside, L24 9LN, United Kingdom

三、恩诺沙星标签

【兽药名称】

通用名称：恩诺沙星

英文名：Enrofloxacin

汉语拼音：Ennuoshaxing

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮存】 遮光，密封，在干燥处保存。

【进口兽药注册证书】

【生产企业】 KVP Kiel 有限责任公司（KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH）。

地址：Projensdorfer StraBe 324, D-24106 Kiel, Germany.

四、托曲珠利标签

【兽药名称】

通用名称：托曲珠利

英文名：Toltrazuril

汉语拼音：Tuoquzhuli

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮存】 遮光，密封，在阴凉干燥处保存。

【进口兽药注册证书】

【生产企业】 KVP Kiel 有限责任公司（KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH）。

地址：Projensdorfer StraBe 324, D-24106 Kiel, Germany.

五、阿莫西林可溶性粉说明书和标签

（一）阿莫西林可溶性粉说明书样稿

兽用

【兽药名称】

通用名：阿莫西林可溶性粉

商品名：派乐新

英文名：Amoxicillin Soluble Powder

汉语拼音：Amoxilin Kerongxingfen

【主要成分】 阿莫西林三水合物。

【性状】 本品为白色至淡黄色粉末。

【药理作用】 抗菌谱及抗菌活性与氨苄西林基本相同，由于其在单胃动物的吸收比氨苄西林好，血药浓度较高，故对全身性感染的疗效较好。适用于敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、皮肤及软组织等全身性感染。

【适应证】 主要用于治疗对阿莫西林敏感的革兰氏阳性菌和阴性菌感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮，每 1kg 体重，鸡，10~20mg，一日 1 次，连用 3~5 日；或每 100L 水，0~4 周龄，6~12g，4 周龄以上，10~20g。

【不良反应】 按推荐剂量使用，未见不良反应。

【注意事项】 （1）本品禁用于豚鼠、仓鼠和兔。

（2）对青霉素类或头孢菌素类过敏的个体应避免接触本品。

（3）处理过程中，应谨慎，避免吸入粉尘或接触皮肤。

【休药期】 鸡 7 日，蛋鸡产蛋期禁用。

【规格】 80%

【包装】

【贮藏】 遮光，密封，25℃以下保存。

【有效期】 3 年。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司意大利生产厂（Intervet Productions S.r.l.）

地址：Via Nettunense KM. 20, 300 Aprilia (LT), Italy

（二）阿莫西林可溶性粉标签样稿

兽用

【兽药名称】

通用名：阿莫西林可溶性粉

商品名：派乐新

英文名：Amoxicillin Soluble Powder

汉语拼音：Amoxilin Kerongxingfen

【主要成分】 阿莫西林三水合物。

【适应证】 主要用于治疗对阿莫西林敏感的革兰氏阳性菌和阴性菌感染。

【用法与用量】 以本品计。混饮，每 1kg 体重，鸡，10~20mg，一日 1 次，连用 3~5 日；或每 100L 水，0~4 周龄，6~12g，4 周龄以上，10~20g。

【休药期】 鸡 7 日，蛋鸡产蛋期禁用。

【规格】 80%

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】 遮光，密封，25℃以下保存。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司意大利生产厂（Intervet Productions S.r.l.）

地址：Via Nettunense KM. 20, 300 Aprilia (LT), Italy

六、猪圆环病毒 2 型杆状病毒载体灭活疫苗说明书和标签

（一）猪圆环病毒 2 型杆状病毒载体灭活疫苗说明书

【兽药名称】

兽用

通用名 猪圆环病毒 2 型杆状病毒载体灭活疫苗

中文商品名 圆福莱

英文名 Porcine Circovirus Type 2 Baculovirus Vector Vaccine, Inactivated

汉语拼音 Zhuyuanhuanbingduerxing Ganzhuangbingduzaiti Miehuoyimiao

【主要成分与含量】 含灭活的表达猪圆环病毒 2 型 ORF2 的杆状病毒，每头份相对效力 \geq 1.0。

【性状】 无色至微黄色混悬液。

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒 2 型感染。免疫后 2 周产生免疫力，免疫期为 4 个月。

【用法与用量】 2 周龄或 2 周龄以上猪，肌肉注射每头 1 头份（1.0ml）。

【注意事项】 （1）不要使疫苗冻结。

（2）一经打开，请立即使用

（3）避光保存

（4）置于儿童接触不到的地方

【规格】 （1）10 头份（10ml）/瓶 （2）50 头份（50ml）/瓶 （3）100 头份（100ml）/瓶 （4）250 头份（250ml）/瓶 （5）500 头份（500ml）/瓶

【包装】 1 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健(美国)有限公司(Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.)

地址 2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri, 64506 U.S.A)

仅在兽医指导下使用

（二）猪圆环病毒 2 型杆状病毒载体灭活疫苗内包装标签

圆福莱
猪圆环病毒2型杆状病毒载体灭活疫苗

兽用

10（50、100、250、500）头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

生产日期：

详见说明书。

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒2型感染。免疫后2周产生免疫力，免疫期为4个月。

【用法与用量】 2周龄或2周龄以上猪，肌肉注射，每头1头份（1.0ml）。

【注意事项】 不要使疫苗冻结；一经打开，请立即使用；避光保存；置于儿童接触不到的地方。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健(美国)有限公司(Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.)
地址: 2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri, 64506 U.S.A)

仅在兽医指导下使用

七、猪繁殖与呼吸综合征活疫苗说明书说明书和标签

（一）猪繁殖与呼吸综合征活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 猪繁殖与呼吸综合征活疫苗

商品名 无

英文名 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Vaccine, Live

汉语拼音名 Zhu Fanzhiyuhuxizonghezheng Huoyimiao

【主要成分与含量】 疫苗中含猪繁殖与呼吸综合征病毒（ATCC VR-2332株），至少 $10^{4.8}$ TCID₅₀/头份。

【性状】 乳白色海绵状疏松团块，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于3周龄以上健康猪，预防猪繁殖与呼吸综合征。

【用法与用量】 按标签上注明的头份数，用专用稀释液进行稀释，充分摇匀后，每头猪肌肉注射1头份（2ml）。

育肥猪，在3周龄或3周龄以上时接种，免疫期为4个月；母猪和后备母猪，在配种前3~4周进行接种，此后，每次配种前进行加强接种，免疫期为4个月。

【不良反应】 接种后，个别猪可能出现过敏反应，可使用肾上腺素进行治疗。

【注意事项】 （1）仅用于对PRRS阳性猪群中的健康猪进行接种。不要对育龄种公猪进行接种。

- (2) 疫苗严禁冻结。
- (3) 疫苗中含有新霉素。
- (4) 稀释后的疫苗应立即使用。
- (5) 接种过程中应采用常规无菌操作方法。
- (6) 使用后的疫苗瓶及剩余疫苗，应焚毁。
- (7) 屠宰前 21 日内禁用。
- (8) 若误将疫苗接种到人体内，请立即寻求医疗帮助。

【规格】 (1) 10 头份/瓶 (2) 50 头份/瓶

【包装】 1 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃ 保存，有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健（美国）有限公司（Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., 2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri, 64506 U.S.A.）

仅在兽医指导下使用

（二）猪繁殖与呼吸综合征活疫苗内包装标签

兽用

猪繁殖与呼吸综合征活疫苗

10（50）头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

详见说明书

【作用与用途】 用于 3 周龄以上健康猪，预防猪繁殖与呼吸综合征。

【用法与用量】 肌肉注射。按注明的头份数用专用稀释液稀释后，每头猪接种 1 头份（2ml）。

【注意事项】 仅用于对 PRRS 阳性猪群中的健康猪进行接种；不要对育龄种公猪进行接种；屠宰前 21 日内禁用；接种后，个别猪可能出现过敏反应，可使用肾上腺素进行治疗。

【贮藏】 2~8℃ 保存。

【生产企业】 勃林格殷格翰动物保健（美国）有限公司（Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., 2621 North Belt Highway, St. Joseph, Missouri, 64506 U.S.A.）

仅在兽医指导下使用

八、恩诺沙星注射液说明书和标签

（一）恩诺沙星注射液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：恩诺沙星注射液

商品名：拜有利 (Baytril)

英文名：Enrofloxacin Injection

汉语拼音：Ennuoshaxing Zhushuye

【主要成分】 恩诺沙星

【性状】 本品为淡黄色澄明液体。

【药理作用】 氟喹诺酮类抗菌药。本品是动物专用的杀菌性广谱抗菌药物。对大肠杆菌、沙门氏菌、克雷伯氏杆菌、布鲁氏菌、巴氏杆菌、胸膜肺炎放线杆菌、丹毒杆菌、变性杆菌、黏质沙雷氏菌、化脓性棒状杆菌、败血波特氏菌、金黄色葡萄球菌、支原体、衣原体等均有良好作用；对绿脓杆菌、链球菌作用较弱，对厌氧菌作用微弱。恩诺沙星作用于细菌细胞的 DNA 旋转酶，干扰细菌 DNA 的复制、转录和修复重组，使细菌不能正常生长繁殖而死亡。

【适应证】 用于治疗猪和牛的细菌及支原体感染。

【用法与用量】 以恩诺沙星计。肌肉注射：一次量，每 1kg 体重，猪 2.5mg，连用 3~5 日。

皮下、静脉注射：一次量，每 1kg 体重，牛 2.5~5mg，连用 2~5 日。

【不良反应】 (1) 注射后，动物的局部组织可能出现暂时性损伤。

(2) 牛静脉注射时，偶发因循环系统紊乱而引起休克。

(3) 用药后牛偶发胃肠功能紊乱。

【注意事项】 (1) 猪每个注射部位不得超过 2.5ml；牛皮下注射每个注射部位不得超过 10ml，犊牛不得超过 5ml。

(2) 本产品与其他抗生素（如大环内酯类抗生素或四环素）合用，可导致药物间相互作用，产生拮抗效应。

(3) 已知对氟喹诺酮类药物过敏的动物，不应使用恩诺沙星进行治疗。

(4) 由于功能性损伤或动物自身体重的原因，生长软骨发生变性或关节部位的肌骨骼系统造成损害的动物，禁用。

(5) 废弃兽药不得同污水一起处理或经污水系统处理。

【休药期】 猪：10 日。牛：静脉注射 7 日，皮下注射 14 日；弃奶期：静脉注射 3 日，皮下注射 5 日。

【规格】 100ml：10g

【包装】

【贮藏】 密闭，在干燥处保存。

【有效期】 3 年。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 KVP Kiel 有限责任公司 (KVP Pharma + Veterinaer Produkte GmbH)

地址：Projensdorfer StraBe 324, 24106 Kiel, Germany

(二) 恩诺沙星注射液标签

兽用

【兽药名称】

通用名：恩诺沙星注射液

商品名：拜有利（Baytril）

英文名：Enrofloxacin Injection

汉语拼音：Ennuoshaxing Zhusheye

【主要成分】 恩诺沙星

【适应证】 用于治疗猪和牛的细菌及支原体感染。

【用法与用量】 以恩诺沙星计。肌肉注射：一次量，每 1kg 体重，猪 2.5mg，连用 3~5 日。
皮下、静脉注射：一次量，每 1kg 体重，牛 2.5~5mg，连用 2~5 日。

【休药期】 猪：10 日。牛：静脉注射 7 日，皮下注射 14 日；弃奶期：静脉注射 3 日，皮下注射 5 日。

【规格】 以 $C_{15}H_{22}FN_3O_6$ 计 100ml : 10g

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】 密闭，在干燥处保存。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 KVP Kiel 有限责任公司（KVP Pharma + Veterinaer Produkte GmbH）

地址：Projensdorfer StraBe 324, 24106 Kiel, Germany

九、注射用血促性素绒促性素说明书说明书和标签

（一）注射用血促性素绒促性素说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：注射用血促性素、绒促性素

商品名：PG600，必精 600

英文名：Serum Gonadotrophin and Chorionic Gonadotrophin for Injection

汉语拼音：Zhusheyong Xuecuxingsu Rongcuxingsu

【主要成分】 血促性素、绒促性素

【性状】 本品为白色或类白色冻干块状物或粉末。

【药理作用】 激素类药。本品具有促卵泡素（FSH）和促黄体素（LH）样作用。对母畜可促进卵泡成熟、排卵和黄体生成，并刺激黄体分泌孕激素。对未成熟卵泡无作用。对公畜可促进睾丸间质细胞分泌雄激素，促使性器官、副性征的发育、成熟，使隐睾病畜的睾丸下降，并促进精子生成。

【适应证】 具有促进卵泡成熟和排卵作用。用于缩短经产母猪和初产母猪的发情间隔，控制同步发情。

【用法与用量】 用 5ml 或 25ml 的磷酸盐缓冲液溶解 1 头份或 5 头份的冻干产品。母猪耳后颈部肌肉、皮下注射：一次量，5ml/头（PMSG 400 IU+hCG 200 IU）。

【不良反应】 本产品属于蛋白质激素，注射后偶见速发的过敏反应。首次出现过敏症状后给予即肾上腺素（1:1000），静脉注射剂量为 2~3 ml，肌肉注射为 2~8 ml。

【注意事项】 （1）在初级黄体期或发情中期给药会促进卵巢囊肿的发生。

（2）妊娠母猪、促性腺激素过敏的母猪禁用。

（3）用磷酸盐缓冲液溶解后的溶液不宜贮存；和其他药物一起使用可能会影响繁殖；不能超剂量使用。

【休药期】 无。

【规格】 （1）PMSG 400 IU + hCG 200 IU + 注射用磷酸盐缓冲液 5ml（1 头份）

（2）PMSG 2000 IU + hCG 1000 IU + 注射用磷酸盐缓冲液 25ml（5 头份）

【包装】 1 头份×5/盒；5 头份×1/盒。

【进口兽药注册证号】

【贮藏】 在 2~8℃ 冰箱保存。溶解后的冻干产品于 2~8℃ 保存，可保存 24 小时。

【有效期】 3 年。

【生产企业】 英特威国际有限公司（Intervet International B.V.）

地址：Wim de korverstraat 35, BOXMEER, 荷兰

（二）注射用血促性素绒促性素标签

兽用

【兽药名称】

通用名：注射用血促性素、绒促性素

商品名：PG600，必精 600

英文名：Serum Gonadotrophin and Chorionic Gonadotrophin for Injection

汉语拼音：Zhusheyong Xuecuxingsu Rongcuxingsu

【主要成分】 血促性素、绒促性素

【适应证】 具有促进卵泡成熟和排卵作用。用于缩短经产母猪和初产母猪的发情间隔，控制同步发情。

【用法与用量】 用 5ml 或 25ml 的磷酸盐缓冲液溶解 1 头份或 5 头份的冻干产品。母猪耳后颈部肌肉、皮下注射：一次量，5ml/头（PMSG 400 IU+hCG 200 IU）。

【休药期】 无。

【规格】 （1）PMSG 400 IU + hCG 200 IU + 注射用磷酸盐缓冲液 5ml（1 头份）

(2) PMSG 2000 IU + hCG 1000 IU + 注射用磷酸盐缓冲液 25ml (5 头份)

【包装】 1 头份×5/盒 (或 5 头份×1/盒)

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】 在 2~8℃冰箱保存。溶解后的冻干产品于 2~8℃保存, 可保存 24 小时。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

地址: Wim de Korverstraat 35, BOXMEER, 荷兰